

## Ką turėčiau žinoti apie VAKCINACIJĄ?

### 1. Kur galiu vakcinuotis nuo COVID-19?

Pasiskiepyti nuo COVID-19 galite visuose Lietuvos vakcinacijos centruose ir mobiliuosiuose punktuose. Informaciją apie vakcinacijos centrus visose savivaldybėse rasite [www.koronastop.lt/vakcina/vakcinacijos-tvarka](http://www.koronastop.lt/vakcina/vakcinacijos-tvarka).

Taip pat, galite skambinti Karštąja linija 1808 ir gauti ne tik visą reikiamą informaciją, bet ir iš karto užsiregistruoti vakcinai nuo COVID-19.

### 2. Kaip užsiregistruoti COVID-19 vakcinai?

Užsiregistruoti į bet kurį Lietuvos vakcinacijos centrą galima [www.koronastop.lt](http://www.koronastop.lt) arba Karštąja linija 1808. Skiepijantis mobiliuosiuose punktuose išankstinės registracijos nereikia. Juose vakcinaciją „gyva eile“ vykdo Nacionalinis kraujo centras. Jų turo per Lietuvą tvarkaraštį galima rasti [www.kraujodonoryste.lt/vakcinacija](http://www.kraujodonoryste.lt/vakcinacija).

Taip pat, kiekvieną ketvirtadienį visuose Lietuvos vakcinacijos centruose vyksta vakcinacija be registracijos. Kviečiame pasinaudoti galimybe COVID-19 vakciną pasiimti greitai ir lengvai. Viskas, ką reikia padaryti, tai nepamiršti su savimi turėti asmens dokumento – paso ar asmens tapatybės kortelės.

### 3. Ar galiu pasirinkti vakciną rūšį?

Taip, registracijos metu galite pasirinkti vakciną, kuria norite skiepytis. Šiuo metu Lietuvoje skiepijama šiomis COVID-19 vakcinomis: „Comirnaty“ (gam. „Pfizer ir BioNTech“), „Spikevax“ (gam. „Moderna“), „Janssen“ (gam. „Janssen Pharmaceutica NV“) ir „Vaxzevria“ (gam. „AstraZeneca“).

### 4. Kokius dokumentus reikia turėti vykstant vakcinuotis?

Asmens dokumentą – pasą arba asmens tapatybės kortelę.

### 5. Ar turiu būti visiškai sveikas, kad galėčiau skiepytis?

Taip. Sergantys, karščiuojantys ar bet kokios ligos ūmiu periodu žmonės neskiepijami.

### 6. Kokie yra dažniausia galimi vakcinų šalutiniai poveikiai?

Nuovargis, skausmas ir patinimas injekcijos vietoje, galvos, raumenų ir sąnarių skausmai, šaltkrėtis, karščiavimas. Įprastai jie praeina po kelių dienų.

### 7. Ką rodo vakcinų šalutiniai poveikiai po gauto skiepo?

Šalutinis poveikis yra ženklas, kad imuninė sistema reaguoja į vakciną ir pradeda gaminti antikūnus, galinčius įveikti virusą ir neleidžiančius jam daugintis, todėl pasiskiepijus išvengiama ligos arba sergama silpnesne ligos forma.

### 8. Kur kreiptis, jei jaučiu nepageidaujamus šalutinius poveikius?

Apie įtariamą nepageidaujamą reakciją į vakciną praneškite savo šeimos gydytojui(-ai) ir (ar) Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai.

### 9. Kada skiriama antra vakcinų dozė?

Antros dozės laikas priklauso nuo to, kokia vakcina skiepijate:

- „Comirnaty“ – praėjus 21 d. po pirmos dozės;
- „Spikevax“ – po 28 d.
- „Vaxzevria“ – po 4-12 sav.
- „Janssen“ – skiepijama tik vieną kartą, todėl antros dozės nereikia.